Farmavizor
MEDICACIÓN INFANTIL SEGURA

FÁRMACOS QUE SE TOMAN CON EL ESTÓMAGO VACÍO O LLENO

¿LOS *ANTIBIÓTICOS* SE TOMAN CON EL ESTÓMAGO LLENO O VACÍO?

Aquí os dejamos los **antibióticos**, en edad pediátrica, que se deberían tomar con o sin alimentos, o si esto no afecta:

CON ALIMENTOS	SIN ALIMENTOS	INDIFERENTE
Cefuroxima-axetilo	Ciprofloxacino	Amoxicilina
Claritromicina	Cloxaciclina	Amoxicilina + Clavulanico
Clindamicina	Eritromicina, estearato	Cefixima
Doxiciclina	Fosfomicina trometanol	
	Norfloxacino	
	Penicilamina	



¿LOS *ANTIFÚNGICOS Y ANTIVIRALES* SE TOMAN CON EL ESTÓMAGO LLENO O VACÍO?

Aquí os dejamos los **antifúngicos y antivirales**, en edad pediátrica, que se deberían tomar con o sin alimentos:

CON ALIMENTOS	SIN ALIMENTOS
Fluconazol	Voriconazol
Aciclovir	
Itraconazol	
Metamizol	

¿LOS *ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS* SE TOMAN CON EL ESTÓMAGO LLENO O VACÍO?

Aquí os dejamos los **analgésicos y antiinflamatorios**, en edad pediátrica, que se deberían tomar con o sin alimentos:

CON ALIMENTOS	SIN ALIMENTOS
Codeina	Paracetamol
Acido AcetilSalicilico	
Codeina+ Bromhexidina + Difenhidramina + Efedrina	
Dexametasona	
Diclofenaco	
Hidrocortisona	
Ibuprofeno	
Naproxeno	
Prednisolona	
Prednisona	

¿LOS *SEDANTES Y ANTIEPILÉPTICOS* SE TOMAN CON EL ESTÓMAGO LLENO O VACÍO?

Aquí os dejamos los **sedantes y antiepilépticos**, en edad pediátrica, que se deberían tomar con o sin alimentos, o si esto no afecta:

CON ALIMENTOS	SIN ALIMENTOS	INDIFERENTE
Clindamicina	Fenobarbital	Alprazolam
Clorazepato dipotásico		Zolpidem
Diazepam		Bromazepam
Fenitoina		Clonazepam
Valproato sódico		Lorazepam
Carbamazepina		Clonidina, hidrocloruro
Carbamazepina		